

UNDA  
gammadyn

GAMMADYN® Zn  
Zinc

UNDA gammadyn

UNDA gammadyn

UNDA gammadyn

**Each Ampoule (2 ml) Contains/  
Chaque ampoule (2 ml) contient:**

Zinc (zinc gluconate)/  
Zinc (gluconate de zinc) . . . . . 67.4 mcg

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, glucose  
Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, glucose

Safety-sealed for your protection and for product  
freshness. Do not use if ampoule is broken. Store in a  
cool, dry place.


Emballage scellé pour votre protection et pour  
garder la fraîcheur du produit. Ne pas utiliser si l'ampoule  
est endommagée. Conserver dans un endroit frais, à l'abri  
de l'humidité.

**Seroyal** UNDA  
Made in France for  
s.a. UNDA n.v.  
Dist. by Seroyal Int'l Inc.  
Richmond Hill, ON L4C 0L8



gammadyn

GAMMADYN® Zn  
Zinc  
NPN 80011692



**30 Ampoules**

**Recommended Dose:**

**Adults and Children (12 years and older):** Take one ampoule one to  
two times daily with meals, a few hours before or after taking other  
medications, or as recommended by your healthcare practitioner.

**Children (1-11 years):** Take 1/2 ampoule one to two times daily with  
meals, a few hours before or after taking other medications, or as  
recommended by your healthcare practitioner.  
Squeeze contents directly into mouth. Use for one to two months, or  
as recommended by your healthcare practitioner.

Oligotherapy Remedy to be used on the advice of your  
healthcare practitioner.

**Risk Information:** If symptoms persist or worsen, consult your  
healthcare practitioner. If you have cancer or a history of tuberculosis,  
do not use. If you are pregnant or breastfeeding, do not use, unless  
directed by your healthcare practitioner.

**Posologie :**




**Adultes et enfants (12 ans et plus) :** Prendre une ampoule une à deux  
fois par jour aux repas, quelques heures avant ou après avoir pris  
d'autres médicaments, ou selon l'avis de votre praticien.

**Enfants (1-11 ans) :** Prendre 1/2 ampoule une à deux fois par jour aux  
repas, quelques heures avant ou après avoir pris d'autres  
médicaments, ou selon l'avis de votre praticien.

Presser les contenu directement dans la bouche. Utiliser pendant une  
à deux mois, ou selon l'avis de votre praticien.

Remède d'oligothérapie à utiliser sur l'avis de votre praticien.

**Mention de risque :** Si les symptômes persistent ou s'aggravent,  
consultez votre praticien. Ne pas utiliser ce produit si vous avez des  
antécédents de cancer ou de tuberculose. Ne pas utiliser ce produit si  
vous êtes enceinte ou si vous allaitez sauf sur l'avis de votre praticien.



BARCODE LOCATION  
883196 31420

Lot

Exp.

Couleurs CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.5405 U

Nom du produit	<b>GAMMADYN Zn -CAN</b>	Dimensions	<b>70 x 60 x 100</b>
----------------	-------------------------	------------	----------------------